


PROTOCOLE DE DISSECTION DE LA PATTE DE GRENOUILLE


1. Repérer les organes externes :

Fixer la moitié de grenouille avec des épingles de part et d'autre du bassin.



2. Dégager le fémur et le nerf sciatique au niveau de la cuisse :

- A l'aide d'une pince et des ciseaux, couper **délicatement** dans le sens de la longueur le muscle de la cuisse.
- Ecarter les chairs pour observer le fémur.
- En dessous du fémur, repérer un cordon blanchâtre, le nerf sciatique. **ATTENTION** de ne pas l'arracher ni le couper.



3. Dégager le nerf sciatique au niveau du bassin :

- Passer une sonde cannelée sous la symphyse pubienne pour la sectionner
- Ecarter les chairs pour observer le fémur et le nerf sciatique.
- Dégager les chairs le long du fémur pour dégager le nerf sciatique jusqu'à la moelle épinière.



4. Isoler le mollet et dégager le nerf sciatique jusqu'à la cheville :

Au niveau de la cheville, couper le tendon d'Achille et les adhérences qui fixent le muscle à l'os.
ATTENTION à préserver le nerf.

Dégager le nerf de la jambe sans le couper au niveau du genou ou de la cheville
C'est un acte délicat car le découpage au niveau du genou se fait « à l'aveugle ».
Il faut bien rester parallèle au muscle.



G.BRIDON